

Wir begleiten  
Ihre erfolgreiche  
Getränkeherstellung

Fruchtsaft- und  
Weintechnologie

**SCHLISSMANN  
SCHWÄBISCH HALL**



Tel. 07 91 - 9 71 91-0 • Fax 9 71 91-25  
C. Schliessmann Kellerei-Chemie GmbH & Co.KG  
Auwiesenstr. 5 • D-74523 Schwäbisch Hall

## Pektin KonGelial

Stand 03\_2022

- **Geliermittel aus nativem Apfelpektin für die Herstellung von Konfitüre, Marmelade, Fruchtaufstrich und Gelee** -  
(standardisiert mit Saccharose und Calciumcitrat, zulässig auch für die Herstellung von Bio-Produkten)

Seite 1/2

### Technische Informationen und Gebrauchshinweise

#### Was ist Pektin?

**Pektin** ist eine in allen Früchten von Natur aus vorkommende „Kittsubstanz“, die die Festigkeit des Fruchtfleisches bewirkt.

Weichfleischige Früchte wie Erdbeeren, Kirschen und Weintrauben beinhalten wenig Pektin. Äpfel, Quitten und Schwarze Johannisbeeren sind dagegen pektinreiche Früchte.

Bei der Bereitung von Konfitüren und Fruchtaufstrichen bewirkt dieses Pektin das Gelieren eines unter Zuckerzusatz gekochten und dann abgekühlten Fruchtmasse. Sehr pektinreiches Kernobst (z.B. Quitten) geliert dabei ohne zusätzlich zugesetztes **Pektin**.

Bei der Verarbeitung von Stein- und Beerenobst sowie von Zitrusfrüchten und bei der Herstellung von Gelees aus Fruchtsaft oder Wein muss dagegen **Pektin** zugesetzt werden, um Produkte mit einer vernünftigen Konsistenz zu bekommen.

#### Die Konfitürenverordnung:

Der Phantasie des häuslichen Obstverarbeiters, der für den Eigenbedarf kocht, sind hinsichtlich der Rezeptur keine Grenzen gesetzt. Für gewerblich hergestellte und für den Verkauf bestimmte Erzeugnisse gelten dagegen die Bestimmungen der Konfitürenverordnung. Sie regelt Herstellung, Beschaffenheit und Deklaration (z.B. Mindestgehalte an Frucht,

Trockensubstanz bzw. Zucker, weitere erlaubte Zutaten wie Honig, Zitronensaft, Spirituosen). Die EU-Verordnung Nr. 1129/2011 nennt zudem Verdickungs-, Säuerung-, Süßungsmittel und Süßstoffe sowie die Voraussetzungen für deren Anwendung.

#### Gelierzucker oder Pektin?

Im Unterschied zum haushaltsüblichen Gelierzucker macht **Pektin KonGelial** Gelierung und Süßung voneinander unabhängig. Dies bedeutet Entscheidungsfreiheit über den Fruchtgehalt, die Menge und Herkunft des Zuckers (Zuckerrohr / -rübe, konventionell / Bio, raffiniert / braun) oder eine alternative Süßung (Fruchtsirup, Zuckeraustauschstoffe). Das Ergebnis können neben herkömmlichen auch besonders fruchtaromatische oder kalorienreduzierte Erzeugnisse sowie Spezialitäten sein. So gelingt z.B. die Extraktion von Holunderblütchen durch trockenes Vermischen mit Zucker und Auswaschen mit Apfelsaft oder Wasser ohne jeglichen Verlust an Pektin, weil dieses dem Extrakt erst anschließend bei seiner Erhitzung zugegeben wird.

**Pektin KonGelial** ist ein aus Äpfeln gewonnenes natives, nicht chemisch modifiziertes Pektin. Es enthält für die Gelierung notwendiges Calcium. Dadurch lässt sich die gewünschte Konsistenz des

Endprodukts allein über die Dosierung an **Pektin KonGelial** sehr gut einstellen.

Da es keine Konservierungsstoffe enthält, eignet sich **Pektin KonGelial** auch für Bio-Produkte und all diejenigen Erzeugnisse, die laut Konfitürenverordnung nicht chemisch konserviert sein dürfen.

#### Haltbarkeit der Endprodukte:

Konfitüren, Marmeladen, Gelees und Fruchtaufstriche sind Fruchtconserven, die im ungeöffneten Glas ohne Kühlung haltbar sein müssen. Voraussetzungen dafür sind gesunde, saubere Früchte, hygienische Arbeitsweise, ein ausreichend hoher Säuregehalt in der Rezeptur (pH-Wert kleiner als 3,5), die Hitzebehandlung (mindestens 5 Minuten Kochen der gesamten Rezeptur) und vor allem das sorgfältige Abfüllen in saubere Gläser mit luftdicht schließendem Schraubdeckel. Besteht der Kopfraum des abgekühlten Glases nicht aus Vakuum, sondern aus Luft, muss mit Schimmelbildung bereits im original verschlossenen Glas gerechnet werden. Der Grund dafür sind Schimmelpilzsporen, die überall vorkommen, die die Pasteurisation überstehen und die sich nur durch absolute Abwesenheit von Luftsauerstoff am Auskeimen und der Bildung eines sichtbaren Schimmelpilzmycel hindern lassen.

Für die Haltbarkeit im Anbruch

sind Säure- und Zuckergehalt der Rezeptur maßgeblich. Je säure- und zuckerärmer das Produkt, desto schlechter wird seine Haltbarkeit nach dem Öffnen sein.

Angebrochene Gläser sollten deshalb im Kühlschrank aufbewahrt und innerhalb einer Woche (Konfitüren und Gelees) bzw. weniger Tage (Fruchtaufstriche) aufgebraucht werden. Kurze Haltbarkeit im Anbruch ist bereits vor der Abfüllung durch die Auswahl kleinerer Gläser zu berücksichtigen.

Wo lebensmittelrechtlich gestattet, könnte die Haltbarkeit durch Zusatz chemischer Konservierungsstoffe (z.B. Sorbinsäure) verlängert werden.

### Einbringen des Pektins:

**Pektin KonGelial** lässt sich -mit einem Teil des Zuckers trocken vorvermischt- gut klumpenfrei in den Fruchtansatz, Saft oder Wein einrühren. Falls ein Stabmixer zur Arbeitserleichterung verwendet wird, sollte man damit möglichst wenig Luft einschlagen, um unnötiger Schaumbildung vorzubeugen. **Wichtiger Hinweis:** Frische Früchte und kalt gepresste Fruchtsäfte können natürliche Enzyme enthalten, die die Gelierkraft des zugesetzten Pektins schwächen. Da diese Enzyme bei Temperaturen über 50°C inaktiviert werden, sollte das Pektin erst bei etwa 60°C eingebracht werden.

### Gelierprobe:

Direkt vor der Abfüllung sollte man prüfen, ob ein Esslöffel voll der kochenden Mischung nach Abkühlung auf einem kalten Teller etwas fester als gewünscht geliert. Da dabei Wasser verdunstet, wird die Festigkeit dieses Ansatzes im Glas eher etwas geringer ausfallen.

### Abfüllen:

Die technisch einwandfreie, sorgfältige Abfüllung gelingt in folgenden Schritten:

- Den sich beim Kochen bildenden Schaum abschöpfen.
- Heiße Masse **randvoll** in saubere, evtl. vorgewärmte Gläser

füllen und sofort fest verschließen.

- Gläser auf den Deckel drehen und **erschütterungsfrei** vollständig abkühlen lassen.

### Rezepturbeispiele:

#### Fruchtaufstrich (ca. 8 kg)

- 100 g **Pektin KonGelial** mit 300 g Zucker vermischen;
- diese Mischung in 5 kg pürierte Früchte einrühren, unter Rühren lösen und aufkochen;
- 2,2 kg Zucker einrühren und erneut aufkochen;
- bei Verarbeitung säurearmer Früchte ca. 30 g Zitronensäure oder 500 mL Zitronensaft zugeben (pH<3,5!);
- 3-4 Minuten unter Rühren weiterkochen;
- heiße Masse abfüllen.

#### Saft- / Weingelee (ca. 7,5 kg)

- 100 g **Pektin KonGelial** mit 300 g Zucker vermischen;
- diese Mischung in 4 - 4,5 L Fruchtsaft oder Wein einrühren, unter Rühren lösen und aufkochen;
- 2,7 kg Zucker einrühren und erneut aufkochen;
- bei Verarbeitung säurearmen Saftes ca. 30 g Zitronensäure oder ca. 500 mL Zitronensaft zugeben (pH<3,5!);
- 3-4 Minuten unter Rühren weiterkochen;
- heiße Mischung abfüllen.

### Mögliche Endproduktmängel:

Zu geringe bzw. zu hohe Dosierung des Pektins kann Dünnflüssigkeit bzw. zu hohe Festigkeit des Erzeugnisses bewirken. Jedoch können auch Rezepturbestandteile die Gelierfähigkeit des Pektins beeinträchtigen, z.B. Rhabarber, frische Chilischoten. Sie erfordern eine höhere Dosierung an Pektin, evtl. auch eine Umstellung der Zugabereihenfolge der Zutaten.

Eine unvollständige Lösung des Pektins beim Einrühren in den Fruchtanteil der Rezeptur kann zu einer ungleichmäßigen Gelierung führen. Zusätzlich besteht das Risiko, dass man beim Abschäumen

aufschwimmendes ungelöstes Pektin abschöpft, welches dann für die spätere erwünschte Gelierung fehlt.

Weitere Voraussetzung für ein homogen durchgelieertes Erzeugnis ist, dass die Gelierung erst während der Abkühlung des gefüllten Glases beginnt und abläuft.

Hohe Mineralstoffgehalte in der Rezeptur (z.B. Rohrzucker, schwere Rotweine) können jedoch zur teilweisen vorzeitigen Gelierung des Pektins bereits während des Kochvorganges führen. Das Ergebnis sind dann Gelees, die keine glatte Schnittfläche zeigen und auf der Zunge eine grießartige Konsistenz verursachen. Zum einen könnte die Verwendung von Raffinade anstelle des Rohrzuckers zumindest in der Vormischung mit Pektin diesen Fehler vermeiden. Zum anderen könnte auch die alternative Gelierung mit unserem „**Pektin, einfach**“ (ohne Calciumzusatz) in etwas höherer Dosierung das Problem beheben. Bräunungsreaktionen lassen viele Endprodukte, die frisch hergestellt eine leuchtende Farbe haben, mit der Zeit verblassen bzw. bräunlich werden. Dieser natürliche Qualitätsverlust lässt sich mit der Zugabe von etwas Ascorbinsäure (Vitamin C, ca. 0,3 g/kg) zusammen mit der Zitronensäure kurz vor der Abfüllung sowie kühle, dunkle Lagerung verzögern.

### Zusammensetzung:

Geliermittel Pektin E440i, Saccharose, Festigungsmittel Calciumcitrat E333 iii

### Lagerung:

Trocken und kühl.

### Gebindegrößen:

20 g Siegelrandbeutel	(Nr. 5549)
100 g Dose	(Nr. 5550)
1 kg Beutel	(Nr. 5551)
5 kg Eimer	(Nr. 5552)

Alle Informationen in dieser Druckschrift entsprechen unseren derzeitigen Erfahrungen und Kenntnissen.

Schliessmann Kellerei-Chemie garantiert weder, dass die Produkte ohne vorheriges sorgfältiges Erproben, wie oben beschrieben, verwendet werden können, noch, dass durch ihren Gebrauch nicht Patentrechte Dritter verletzt werden.